



FAQ SUR LA PÉRITONITE INFECTIEUSE FÉLINE ET LE GS-441524 : PROPRIÉTAIRES

CONTEXTE GÉNÉRAL

Q. Qu'est-ce que la péritonite infectieuse féline, aussi connue sous le nom de PIF?

La PIF est une maladie causée par un coronavirus, qui touche les chats (et non les humains). La plupart des chats exposés au virus ne contracteront pas la PIF. Chez certains chats, le virus se modifie et interagit avec le système immunitaire, ce qui peut causer une maladie sévère – la PIF – qui peut toucher différentes parties du corps et entraîner des problèmes de santé qui varient d'un chat à l'autre.

Q. Quels sont les signes que les chats avec la PIF peuvent présenter?

Les chats peuvent présenter des signes différents selon la partie du corps qui est touchée. Les signes les plus courants sont la perte d'appétit, une grande fatigue, la perte de poids et la fièvre. L'abdomen (le ventre) enflé, une démarche instable, des convulsions, des changements aux yeux et une peau jaunâtre peuvent aussi être des signes de la maladie.

Q. Est-ce que la PIF est contagieuse pour les autres chats? Dois-je séparer mes chats?

Si vous avez plus d'un chat, vous n'avez pas besoin de les séparer. Le coronavirus félin peut être transmis aux autres chats, mais ce ne sont pas tous les chats infectés qui vont présenter des signes de la maladie. Donc, si vous avez plus d'un chat, il est très probable que tous vos chats aient déjà été exposés au virus, mais qu'un seul ait contracté la PIF. Toutefois, les chats qui ont des liens de parenté sont exposés à un risque plus élevé de manifester la maladie. Donc, si vos chats ont des liens de parenté et que la situation vous inquiète, communiquez avec votre vétérinaire afin qu'il puisse vous faire ses recommandations.

TRAITEMENT

Q. Comment traite-t-on la PIF?

Votre vétérinaire a prescrit un médicament qui s'appelle GS-441524. C'est un antiviral que vous donnerez à votre chat une à deux fois par jour pendant 84 jours (12 semaines). La plupart du temps, les chats se sentent mieux en trois à cinq jours, mais il est crucial de poursuivre le traitement pendant 12 semaines.

Selon ses symptômes, votre chat pourrait aussi avoir besoin d'autres traitements, comme des antidouleurs, des fluides ou des gouttes pour les yeux. Demandez à votre vétérinaire ce qui est recommandé pour votre animal.

Q. J'ai plus d'un chat. Dois-je aussi traiter mes autres chats avec la suspension orale GS-441524?

Non, seulement les chats qui ont un diagnostic de PIF devraient être traités avec la suspension orale GS-441524.

Q. Quelle quantité de suspension orale GS-441524 mon chat doit-il prendre?

Votre vétérinaire décidera de la quantité (dose) du médicament à donner. La suspension orale GS-441524 est un médicament qui s'administre selon le poids. Donc, la dose à donner sera ajustée si votre chat prend ou perd du poids. Votre vétérinaire vous dira quelle quantité de GS-441524 donner à votre chat et ajustera la dose au besoin.

Q. Comment puis-je donner GS-441524?

GS-441524 est une suspension orale, ce qui veut dire que c'est un liquide que votre chat doit avaler. Il est généralement préférable de le donner deux fois par jour dans un peu de nourriture ou de gâterie. Il faut aussi donner le médicament au moins une heure avant un repas complet. Essayez de faire de l'administration du médicament une expérience positive en donnant une gâterie (sans médicament) juste après, en brossant votre animal ou en jouant avec lui, tant que c'est quelque chose qui lui plaît.

Si vous n'arrivez pas à donner le médicament deux fois par jour, votre vétérinaire pourrait vous suggérer de le donner une fois par jour.

Suivez toujours les directives de votre vétérinaire.

Q. Dans combien de temps mon chat ira-t-il mieux?

La plupart des chats commenceront à se sentir mieux et ne feront plus de fièvre après trois à cinq jours, mais vous devrez tout de même continuer le traitement jusqu'à la fin pour aider votre chat à se remettre complètement.

Ne sautez pas de doses et n'arrêtez pas le traitement sans en parler d'abord avec votre vétérinaire.



FAQ SUR LA PÉRITONITE INFECTIEUSE FÉLINE ET LE GS-441524 : PROPRIÉTAIRES

Q. Comment mon vétérinaire fera-t-il le suivi du traitement de mon chat?

Votre vétérinaire décidera du moment où il a besoin d'examiner votre chat une fois le traitement débuté. Plus important encore, votre vétérinaire devra faire le suivi du poids de votre chat afin de s'assurer qu'il reçoit la bonne dose de la suspension orale GS-441524.

Pendant le traitement de votre chat, votre vétérinaire pourrait vouloir voir votre chat plus ou moins souvent, selon qu'il répond bien ou non au traitement. Vous devez contacter votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes au sujet de votre chat entre les visites.

Q. Combien de temps le traitement antiviral dure-t-il?

La période de traitement avec la suspension orale GS-441524 est habituellement de 84 jours (12 semaines). Ne sautez pas de dose et n'arrêtez pas le traitement sans en parler d'abord avec votre vétérinaire.

Q. Que puis-je faire à la maison pour aider mon chat?

Ce qui est le plus important à la maison est de traiter votre chat en suivant les directives de votre vétérinaire. Vous devriez aussi surveiller les symptômes de votre chat et son poids. (Pour peser les chats, il est plus précis d'utiliser un pèse-bébé qu'un pèse-personne.)

Il est important que votre chat mange bien. Assurez-vous de surveiller son appétit et ne changez pas sa nourriture, à moins que ce soit une recommandation de votre vétérinaire. Essayez de garder votre chat aussi calme et détendu que possible.

Q. Puis-je faire vacciner mon chat ou le traiter contre les puces et les vers pendant son traitement par GS-441524?

La vaccination est importante pour prévenir d'autres maladies sévères. Elle doit donc être administrée selon les recommandations de votre vétérinaire. Toutefois, les chats ne devraient être vaccinés que lorsqu'ils sont en santé. Votre vétérinaire pourrait donc décider de retarder la vaccination jusqu'à ce que le traitement soit terminé ou presque terminé.

Les traitements contre les puces et les vers peuvent habituellement être donnés pendant le traitement par GS-441524, mais votre vétérinaire vous dira ce qui est le mieux pour vous et votre chat.

Q. Est-ce que mon chat peut subir une chirurgie pendant son traitement par GS-441524?

Les chats ne devraient être opérés que lorsqu'ils sont en santé. Votre vétérinaire pourrait donc retarder une chirurgie jusqu'à ce que son traitement soit terminé ou presque terminé. Votre vétérinaire décidera de ce qui est le mieux pour vous et votre chat.

Q. Qu'arrivera-t-il une fois le traitement par GS-441524 de mon chat terminé?

Votre vétérinaire examinera votre chat et déterminera si le traitement peut être arrêté ou doit être prolongé. Votre chat devrait aussi être réexaminé quatre semaines après la fin du traitement. Si vous avez des inquiétudes pendant ou après le traitement, contactez votre vétérinaire.

